

クロス集計結果等(薬剤師票分)

問1-3 令和4年12月における居宅療養管理指導の実施状況

単一の建物において訪問した利用者数 ①1人

	調査数	平均	標準偏差	最小値	最大値
1人/居宅療養管理指導費の算定件数(問1-3-1-1)	266	9.14	20.48	0.00	196.00
1人/1. 主に利用者に説明・指導を行っている利用者数(問1-3-2-1-1)	233	4.38	8.13	0.00	81.00
1人/2. 1の利用者における平均指導時間(問1-3-2-1-2)	218	19.72	11.90	1.00	102.00
1人/3. 主に家族に説明・指導を行っている利用者数(問1-3-2-1-3)	220	1.51	3.06	0.00	31.00
1人/4. 3の利用者における平均指導時間(問1-3-2-1-4)	122	16.07	8.48	3.00	30.00
1人/5. 主に施設の職員に説明・指導を行っている利用者数(問1-3-2-1-5)	208	0.52	2.89	0.00	39.00
1人/6. 5の利用者における平均指導時間(問1-3-2-1-6)	39	9.10	6.03	2.00	30.00
1人/4週に1回未満の利用者の数(問1-3-3-1-1)	140	0.66	2.65	0.00	30.00
1人/4週に1回の利用者の数(問1-3-3-1-2)	184	2.34	4.03	0.00	32.00
1人/3週に1回の利用者の数(問1-3-3-1-3)	122	0.19	0.73	0.00	7.00
1人/2週に1回の利用者の数(問1-3-3-1-4)	203	3.58	7.60	0.00	73.00
1人/週に1回の利用者の数(問1-3-3-1-5)	153	0.86	1.63	0.00	12.00
1人/週に2回以上の利用者の数(問1-3-3-1-6)	121	0.17	0.97	0.00	10.00

主なフォローアップの手段/1人(問1-3-4-1)

調査数	246
電話	69.9
メール	4.1
ビデオ	-
チャット	0.4
対面	57.7
その他	1.6
無回答	2.0

単一の建物において訪問した利用者数 ②2~9人

	調査数	平均	標準偏差	最小値	最大値
2~9人/居宅療養管理指導費の算定件数(問1-3-1-2)	200	6.10	21.67	0.00	200.00
2~9人/1. 主に利用者に説明・指導を行っている利用者数(問1-3-2-2-1)	51	3.37	5.72	0.00	26.00
2~9人/2. 1の利用者における平均指導時間(問1-3-2-2-2)	34	15.15	11.46	2.00	60.00
2~9人/3. 主に家族に説明・指導を行っている利用者数(問1-3-2-2-3)	47	0.30	0.87	0.00	4.00
2~9人/4. 3の利用者における平均指導時間(問1-3-2-2-4)	7	12.43	5.95	2.00	20.00
2~9人/5. 主に施設の職員に説明・指導を行っている利用者数(問1-3-2-2-5)	53	8.04	11.55	0.00	54.00
2~9人/6. 5の利用者における平均指導時間(問1-3-2-2-6)	38	7.39	6.02	1.00	30.00
2~9人/4週に1回未満の利用者の数(問1-3-3-2-1)	26	0.15	0.36	0.00	1.00
2~9人/4週に1回の利用者の数(問1-3-3-2-2)	36	1.89	3.30	0.00	19.00
2~9人/3週に1回の利用者の数(問1-3-3-2-3)	24	0.29	1.06	0.00	5.00
2~9人/2週に1回の利用者の数(問1-3-3-2-4)	51	7.98	10.33	0.00	54.00
2~9人/週に1回の利用者の数(問1-3-3-2-5)	28	1.75	5.43	0.00	28.00
2~9人/週に2回以上の利用者の数(問1-3-3-2-6)	25	0.60	2.08	0.00	9.00

主なフォローアップの手段／2～9人 (問1-3-4-2)

調査数	62
電話	59.7
メール	4.8
ビデオ	-
チャット	-
対面	67.7
その他	-
無回答	6.5

単一の建物において訪問した利用者数 ③10人以上

	調査数	平均	標準偏差	最小値	最大値
10人以上／居宅療養管理指導費の算定件数 (問1-3-1-3)	198	49.72	161.03	0.00	1453.00
10人以上／1. 主に利用者に説明・指導を行っている利用者数 (問1-3-2-3-1)	42	33.52	71.98	0.00	340.00
10人以上／2. 1の利用者における平均指導時間 (問1-3-2-3-2)	21	7.43	3.50	3.00	15.00
10人以上／3. 主に家族に説明・指導を行っている利用者数 (問1-3-2-3-3)	40	0.13	0.78	0.00	5.00
10人以上／4. 3の利用者における平均指導時間 (問1-3-2-3-4)	1	15.00	0.00	15.00	15.00
10人以上／5. 主に施設の職員に説明・指導を行っている利用者数 (問1-3-2-3-5)	52	61.60	81.99	0.00	378.00
10人以上／6. 5の利用者における平均指導時間 (問1-3-2-3-6)	49	9.82	17.44	1.00	120.00
10人以上／4週に1回未満の利用者数 (問1-3-3-3-1)	28	3.18	15.75	0.00	85.00
10人以上／4週に1回の利用者数 (問1-3-3-3-2)	35	2.43	5.06	0.00	26.00
10人以上／3週に1回の利用者数 (問1-3-3-3-3)	26	0.08	0.38	0.00	2.00
10人以上／2週に1回の利用者数 (問1-3-3-3-4)	45	39.27	52.34	0.00	265.00
10人以上／週に1回の利用者数 (問1-3-3-3-5)	36	58.28	97.94	0.00	388.00
10人以上／週に2回以上の利用者数 (問1-3-3-3-6)	27	6.44	23.24	0.00	120.00

主なフォローアップの手段／10人以上 (問1-3-4-3)

調査数	57
電話	64.9
メール	7.0
ビデオ	-
チャット	5.3
対面	70.2
その他	3.5
無回答	1.8

問2-5-1÷問1-2-⑧居宅療養管理指導算定者数

調査数	平均	標準偏差	最小値	最大値
230	0.00	0.01	0.00	0.09

	調査数	合計
問2-5-1の回答人数の合計	230	9
問1-2-⑧の回答人数の合計	230	7002

問2-5-3÷問1-2-⑧居宅療養管理指導算定者数

調査数	平均	標準偏差	最小値	最大値
216	0.01	0.07	0.00	1.00

	調査数	合計
問2-5-3の回答人数の合計	216	13
問1-2-⑧の回答人数の合計	216	6358

薬剤師が居宅療養管理指導を行っている利用者のうち、ショートステイに入所した者がいるか(問2-6)\*薬剤師が居宅療養管理指導を行っている利用者がショートステイに入所した際の薬学的管理指導の実施状況(問2-7)

	調査数	ショートステイ入所中にも、訪問による薬学的管理指導を実施したことがある	医師やショートステイ事業所、利用者等から、ショートステイ入所中に、訪問による薬学的管理指導を実施するよう求められたことがある	ショートステイ事業所への薬剤に関する情報共有や指導等(訪問によるものを除く)を実施したことがある	医師やショートステイ事業所、利用者等から、ショートステイ事業所への薬剤に関する情報共有や指導等(訪問によるものを除く)を求められたことがある	その他	上記のいずれにもあてはまらない	不明
調査数	290	8.3	6.6	11.4	11.0	1.7	65.2	11.0
いる	83	16.9	14.5	27.7	21.7	2.4	54.2	-
いない	164	5.5	3.0	5.5	6.1	1.8	70.7	14.6
わからない	40	2.5	5.0	2.5	10.0	-	70.0	12.5

介護力の状況(問5-5-1)\*計画していた1月あたりの訪問回数(問5-13-1-1-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	421	1.99	1.11	1.00	8.00
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	157	2.21	1.22	1.00	8.00
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	72	1.92	1.01	1.00	5.00
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	63	1.83	0.98	1.00	4.00
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	126	1.83	1.01	1.00	8.00
その他	3	2.33	1.89	1.00	5.00

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*計画していた1月あたりの訪問回数(問5-13-1-1-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	625	2.12	1.16	1.00	8.00
自立度Ⅲ～M	149	2.30	1.29	1.00	8.00
自立度Ⅱ以下	422	2.03	1.08	1.00	8.00

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*計画していた1月あたりの訪問回数(問5-13-1-1-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	625	2.12	1.16	1.00	8.00
認知症あり	238	2.23	1.14	1.00	8.00
認知症なし	371	2.03	1.10	1.00	8.00

人生の最終段階(終末期)にあるか(問5-9-1)\*計画していた1月あたりの訪問回数(問5-13-1-1-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	625	2.12	1.16	1.00	8.00
はい	84	2.29	1.19	1.00	8.00
いいえ	541	2.09	1.16	1.00	8.00

利用者の疾患等(問5-12-1)\*計画していた1月あたりの訪問回数(問5-13-1-1-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	625	2.12	1.16	1.00	8.00
脳血管疾患(脳卒中)	103	2.16	1.19	1.00	8.00
心疾患(心臓病)	176	2.02	1.12	1.00	7.00
悪性新生物(がん)	51	2.39	1.36	1.00	8.00
呼吸器疾患	63	2.03	1.10	1.00	5.00
関節疾患	67	2.22	1.37	1.00	8.00
認知症	238	2.23	1.14	1.00	8.00
パーキンソン病	37	2.19	1.11	1.00	5.00
糖尿病	112	2.25	1.17	1.00	6.00
視覚・聴覚障害	19	2.58	1.23	1.00	6.00
骨折・転倒	54	2.13	1.04	1.00	6.00
脊髄損傷	10	2.00	1.10	1.00	5.00
高齢による衰弱	124	2.11	1.18	1.00	8.00
関節リウマチ	23	1.87	1.03	1.00	4.00
筋萎縮性側索硬化症	4	2.00	0.71	1.00	3.00
後縦靭帯骨化症	2	1.50	0.50	1.00	2.00
骨折を伴う骨粗鬆症	38	2.29	1.47	1.00	8.00
脊髄小脳変性症	1	2.00	0.00	2.00	2.00
脊柱管狭窄症	20	2.05	1.12	1.00	6.00
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	5	2.00	1.10	1.00	4.00
閉塞性動脈硬化症	10	2.20	0.98	1.00	4.00
慢性閉塞性肺疾患	11	1.55	0.99	1.00	4.00
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	24	1.67	0.90	1.00	4.00
その他	95	2.20	1.05	1.00	4.00

介護力の状況(問5-5-1)\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費を算定したもの)(問5-13-1-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	410	1.93	1.06	1.00	8.00
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	153	2.10	1.12	1.00	8.00
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	71	1.94	0.95	1.00	4.00
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	61	1.79	1.01	1.00	6.00
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	122	1.78	1.02	1.00	8.00
その他	3	2.33	1.89	1.00	5.00

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費を算定したもの)(問5-13-1-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	609	2.05	1.08	1.00	8.00
自立度Ⅲ～M	145	2.19	1.13	1.00	8.00
自立度Ⅱ以下	410	1.97	1.05	1.00	8.00

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費を算定したもの)(問5-13-1-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	609	2.05	1.08	1.00	8.00
認知症あり	234	2.13	0.99	1.00	5.00
認知症なし	360	1.99	1.10	1.00	8.00

人生の最終段階(終末期)にあるか(問5-9-1)\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費を算定したもの)(問5-13-1-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	609	2.05	1.08	1.00	8.00
はい	81	2.23	1.08	1.00	6.00
いいえ	528	2.02	1.08	1.00	8.00

利用者の疾患等(問5-12-1)\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費を算定したもの)(問5-13-1-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	609	2.05	1.08	1.00	8.00
脳血管疾患(脳卒中)	99	2.02	0.94	1.00	4.00
心疾患(心臓病)	173	1.88	0.93	1.00	4.00
悪性新生物(がん)	52	2.31	1.29	1.00	8.00
呼吸器疾患	63	1.90	0.95	1.00	4.00
関節疾患	65	2.11	1.17	1.00	8.00
認知症	234	2.13	0.99	1.00	5.00
パーキンソン病	37	2.14	1.07	1.00	4.00
糖尿病	107	2.17	1.13	1.00	7.00
視覚・聴覚障害	18	2.39	0.95	1.00	4.00
骨折・転倒	52	2.21	1.08	1.00	6.00
脊髄損傷	9	2.22	1.75	1.00	7.00
高齢による衰弱	119	2.12	1.14	1.00	8.00
関節リウマチ	22	1.77	0.73	1.00	4.00
筋萎縮性側索硬化症	4	2.00	0.71	1.00	3.00
後縦靭帯骨化症	2	1.50	0.50	1.00	2.00
骨折を伴う骨粗鬆症	37	2.19	1.43	1.00	8.00
脊髄小脳変性症	1	2.00	0.00	2.00	2.00
脊柱管狭窄症	20	1.85	0.85	1.00	4.00
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	5	2.00	1.10	1.00	4.00
閉塞性動脈硬化症	9	2.11	0.87	1.00	4.00
慢性閉塞性肺疾患	11	1.55	0.99	1.00	4.00
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	23	1.65	0.76	1.00	4.00
その他	93	2.12	1.04	1.00	4.00

介護力の状況(問5-5-1)\*訪問回数の実績(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定したもの)(問5-13-1-3-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	396	0.21	0.70	0.00	4.00
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	145	0.28	0.82	0.00	4.00
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	66	0.05	0.21	0.00	1.00
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	60	0.17	0.55	0.00	3.00
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	122	0.22	0.71	0.00	4.00
その他	3	1.33	1.89	0.00	4.00

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*訪問回数の実績(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定したもの)(問5-13-1-3-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	576	0.21	0.67	0.00	4.00
自立度Ⅲ～M	132	0.24	0.77	0.00	4.00
自立度Ⅱ以下	391	0.19	0.63	0.00	4.00

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*訪問回数の実績(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定したもの)(問5-13-1-3-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	576	0.21	0.67	0.00	4.00
認知症あり	214	0.28	0.78	0.00	4.00
認知症なし	350	0.14	0.54	0.00	4.00

人生の最終段階(終末期)にあるか(問5-9-1)\*訪問回数の実績(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定したもの)(問5-13-1-3-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	576	0.21	0.67	0.00	4.00
はい	80	0.34	0.81	0.00	4.00
いいえ	496	0.19	0.65	0.00	4.00

利用者の疾患等(問5-12-1)\*訪問回数の実績(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定したもの)(問5-13-1-3-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	576	0.21	0.67	0.00	4.00
脳血管疾患(脳卒中)	89	0.11	0.53	0.00	4.00
心疾患(心臓病)	164	0.12	0.48	0.00	3.00
悪性新生物(がん)	51	0.43	0.95	0.00	4.00
呼吸器疾患	63	0.25	0.80	0.00	4.00
関節疾患	62	0.08	0.33	0.00	2.00
認知症	214	0.28	0.78	0.00	4.00
パーキンソン病	36	0.36	0.82	0.00	4.00
糖尿病	101	0.17	0.58	0.00	3.00
視覚・聴覚障害	18	0.17	0.69	0.00	3.00
骨折・転倒	52	0.27	0.79	0.00	4.00
脊髄損傷	10	0.20	0.60	0.00	2.00
高齢による衰弱	119	0.21	0.58	0.00	4.00
関節リウマチ	19	0.42	0.88	0.00	3.00
筋萎縮性側索硬化症	3	0.00	0.00	0.00	0.00
後縦靭帯骨化症	2	0.00	0.00	0.00	0.00
骨折を伴う骨粗鬆症	33	0.39	0.89	0.00	4.00
脊髄小脳変性症	1	0.00	0.00	0.00	0.00
脊柱管狭窄症	16	0.19	0.53	0.00	2.00
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	4	0.00	0.00	0.00	0.00
閉塞性動脈硬化症	9	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性閉塞性肺疾患	11	0.00	0.00	0.00	0.00
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	20	0.20	0.60	0.00	2.00
その他	83	0.13	0.58	0.00	4.00

介護力の状況(問5-5-1)\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料のいずれも算定しなかったもの)(問5-13-1-4-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	391	0.34	0.81	0.00	6.00
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	141	0.35	0.91	0.00	6.00
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	66	0.35	0.69	0.00	2.00
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	60	0.47	0.92	0.00	4.00
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	121	0.26	0.67	0.00	4.00
その他	3	0.33	0.47	0.00	1.00

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料のいずれも算定しなかったもの)(問5-13-1-4-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	573	0.43	0.93	0.00	7.00
自立度Ⅲ～M	132	0.81	1.30	0.00	7.00
自立度Ⅱ以下	388	0.31	0.73	0.00	4.00

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料のいずれも算定しなかったもの)(問5-13-1-4-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	573	0.43	0.93	0.00	7.00
認知症あり	212	0.65	1.17	0.00	7.00
認知症なし	349	0.31	0.73	0.00	4.00

人生の最終段階(終末期)にあるか(問5-9-1)\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料のいずれも算定しなかったもの)(問5-13-1-4-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	573	0.43	0.93	0.00	7.00
はい	81	0.75	1.33	0.00	7.00
いいえ	492	0.37	0.83	0.00	4.00

利用者の疾患等(問5-12-1)\*訪問回数の実績(居宅療養管理指導費・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料のいずれも算定しなかったもの)(問5-13-1-4-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	573	0.43	0.93	0.00	7.00
脳血管疾患(脳卒中)	90	0.49	1.00	0.00	6.00
心疾患(心臓病)	163	0.42	1.04	0.00	7.00
悪性新生物(がん)	49	0.61	0.99	0.00	4.00
呼吸器疾患	62	0.32	0.74	0.00	3.00
関節疾患	61	0.41	0.86	0.00	4.00
認知症	212	0.65	1.17	0.00	7.00
パーキンソン病	36	0.50	1.28	0.00	7.00
糖尿病	103	0.53	1.06	0.00	6.00
視覚・聴覚障害	18	0.56	0.96	0.00	3.00
骨折・転倒	52	0.67	1.31	0.00	7.00
脊髄損傷	10	0.70	1.00	0.00	3.00
高齢による衰弱	116	0.54	1.12	0.00	7.00
関節リウマチ	17	0.59	1.19	0.00	4.00
筋萎縮性側索硬化症	3	1.33	1.89	0.00	4.00
後縦靭帯骨化症	2	0.00	0.00	0.00	0.00
骨折を伴う骨粗鬆症	33	0.48	0.86	0.00	3.00
脊髄小脳変性症	1	0.00	0.00	0.00	0.00
脊柱管狭窄症	16	0.88	1.27	0.00	4.00
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	3	1.67	1.25	0.00	3.00
閉塞性動脈硬化症	10	0.40	0.66	0.00	2.00
慢性閉塞性肺疾患	11	0.18	0.57	0.00	2.00
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	19	0.58	0.82	0.00	2.00
その他	84	0.44	0.90	0.00	4.00

介護力の状況(問5-5-1)\*問5-1-13の②から④の合計

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	372	2.42	1.62	1.00	10.00
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	135	2.69	1.87	1.00	10.00
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	63	2.41	1.15	1.00	5.00
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	58	2.41	1.51	1.00	7.00
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	113	2.08	1.34	1.00	8.00
その他	3	4.00	4.24	1.00	10.00

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*問5-1-13の②から④の合計

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	549	2.65	1.70	1.00	12.00
自立度Ⅲ～M	128	3.33	2.20	1.00	12.00
自立度Ⅱ以下	369	2.38	1.38	1.00	10.00

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*問5-1-13の②から④の合計

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	549	2.65	1.70	1.00	12.00
認知症あり	207	3.05	1.92	1.00	12.00
認知症なし	331	2.39	1.46	1.00	9.00

人生の最終段階(終末期)にあるか(問5-9-1)\*問5-1-13の②から④の合計

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	549	2.65	1.70	1.00	12.00
はい	78	3.29	2.22	1.00	12.00
いいえ	471	2.54	1.58	1.00	10.00

利用者の疾患等 (問5-12-1)\*問5-1-13の②から④の合計

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	549	2.65	1.70	1.00	12.00
脳血管疾患(脳卒中)	86	2.58	1.65	1.00	10.00
心疾患(心臓病)	156	2.44	1.79	1.00	12.00
悪性新生物(がん)	48	3.08	1.69	1.00	10.00
呼吸器疾患	61	2.52	1.63	1.00	8.00
関節疾患	58	2.66	1.61	1.00	9.00
認知症	207	3.05	1.92	1.00	12.00
パーキンソン病	36	3.03	2.19	1.00	12.00
糖尿病	95	2.79	1.78	1.00	10.00
視覚・聴覚障害	17	3.18	1.69	1.00	6.00
骨折・転倒	49	3.04	2.11	1.00	12.00
脊髄損傷	9	3.00	2.16	1.00	8.00
高齢による衰弱	110	2.86	1.98	1.00	12.00
関節リウマチ	16	2.31	1.26	1.00	5.00
筋萎縮性側索硬化症	3	3.33	2.62	1.00	7.00
後縦靭帯骨化症	2	1.50	0.50	1.00	2.00
骨折を伴う骨粗鬆症	32	2.97	1.81	1.00	9.00
脊髄小脳変性症	1	2.00	0.00	2.00	2.00
脊柱管狭窄症	15	2.93	2.05	1.00	8.00
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	3	4.00	2.16	1.00	6.00
閉塞性動脈硬化症	8	2.38	1.49	1.00	6.00
慢性閉塞性肺疾患	11	1.73	1.21	1.00	4.00
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	18	2.61	1.60	1.00	6.00
その他	82	2.74	1.64	1.00	8.00

介護力の状況 (問5-5-1)\*医師または歯科医師との同行訪問の回数 (問5-13-1-5-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	390	0.07	0.41	0.00	4.00
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	142	0.05	0.27	0.00	2.00
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	66	0.00	0.00	0.00	0.00
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	58	0.02	0.13	0.00	1.00
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	121	0.15	0.65	0.00	4.00
その他	3	0.00	0.00	0.00	0.00

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*医師または歯科医師との同行訪問の回数 (問5-13-1-5-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	573	0.29	0.78	0.00	4.00
自立度Ⅲ～M	134	0.64	1.13	0.00	4.00
自立度Ⅱ以下	387	0.20	0.62	0.00	4.00

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*医師または歯科医師との同行訪問の回数 (問5-13-1-5-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	573	0.29	0.78	0.00	4.00
認知症あり	214	0.33	0.78	0.00	4.00
認知症なし	348	0.26	0.76	0.00	4.00

人生の最終段階(終末期)にあるか (問5-9-1)\*医師または歯科医師との同行訪問の回数 (問5-13-1-5-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	573	0.29	0.78	0.00	4.00
はい	79	0.27	0.74	0.00	4.00
いいえ	494	0.30	0.79	0.00	4.00

利用者の疾患等(問5-12-1)\*医師または歯科医師との同行訪問の回数(問5-13-1-5-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	573	0.29	0.78	0.00	4.00
脳血管疾患(脳卒中)	89	0.38	0.97	0.00	4.00
心疾患(心臓病)	164	0.22	0.63	0.00	4.00
悪性新生物(がん)	50	0.20	0.82	0.00	4.00
呼吸器疾患	63	0.05	0.28	0.00	2.00
関節疾患	63	0.54	1.07	0.00	4.00
認知症	214	0.33	0.78	0.00	4.00
パーキンソン病	36	0.28	0.80	0.00	4.00
糖尿病	101	0.32	0.82	0.00	4.00
視覚・聴覚障害	19	0.42	0.82	0.00	2.00
骨折・転倒	52	0.23	0.61	0.00	2.00
脊髄損傷	10	0.10	0.30	0.00	1.00
高齢による衰弱	113	0.27	0.73	0.00	4.00
関節リウマチ	18	0.44	0.76	0.00	2.00
筋萎縮性側索硬化症	3	0.67	0.94	0.00	2.00
後縦靭帯骨化症	2	0.00	0.00	0.00	0.00
骨折を伴う骨粗鬆症	35	0.43	0.80	0.00	2.00
脊髄小脳変性症	1	0.00	0.00	0.00	0.00
脊柱管狭窄症	17	0.41	1.03	0.00	4.00
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	4	0.50	0.87	0.00	2.00
閉塞性動脈硬化症	10	0.60	0.92	0.00	2.00
慢性閉塞性肺疾患	11	0.09	0.29	0.00	1.00
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	21	0.76	1.11	0.00	4.00
その他	83	0.27	0.75	0.00	4.00

介護力の状況(問5-5-1)\*直接指導を行った主な対象者(問5-13-6-1)

	全体	本人	家族	施設職員	その他の介護者・看護者
全体	421	73.2	23.3	1.2	2.4
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	157	90.4	3.8	1.3	4.5
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	72	79.2	18.1	1.4	1.4
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	63	87.3	9.5	1.6	1.6
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	126	41.3	57.1	0.8	0.8
その他	3	66.7	33.3	-	-

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*直接指導を行った主な対象者(問5-13-6-1)

	全体	本人	家族	施設職員	その他の介護者・看護者
全体	625	56.5	15.8	24.8	2.9
自立度Ⅲ～M	149	23.5	20.1	51.0	5.4
自立度Ⅱ以下	422	71.3	13.7	13.5	1.4

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*直接指導を行った主な対象者(問5-13-6-1)

	全体	本人	家族	施設職員	その他の介護者・看護者
全体	625	56.5	15.8	24.8	2.9
認知症あり	238	43.3	13.0	40.3	3.4
認知症なし	371	66.6	17.3	13.7	2.4

人生の最終段階(終末期)にあるか(問5-9-1)\*直接指導を行った主な対象者(問5-13-6-1)

	全体	本人	家族	施設職員	その他の介護者・看護者
全体	625	56.5	15.8	24.8	2.9
はい	84	31.0	36.9	28.6	3.6
いいえ	541	60.4	12.6	24.2	2.8

利用者の疾患等(問5-12-1)\*直接指導を行った主な対象者(問5-13-6-1)

	全体	本人	家族	施設職員	その他の介護者・看護者
全体	625	56.5	15.8	24.8	2.9
脳血管疾患(脳卒中)	103	52.4	21.4	25.2	1.0
心疾患(心臓病)	176	61.4	14.2	23.9	0.6
悪性新生物(がん)	51	58.8	21.6	15.7	3.9
呼吸器疾患	63	63.5	22.2	9.5	4.8
関節疾患	67	68.7	11.9	17.9	1.5
認知症	238	43.3	13.0	40.3	3.4
パーキンソン病	37	45.9	32.4	18.9	2.7
糖尿病	112	67.9	8.0	21.4	2.7
視覚・聴覚障害	19	57.9	5.3	31.6	5.3
骨折・転倒	54	70.4	11.1	13.0	5.6
脊髄損傷	10	60.0	40.0	-	-
高齢による衰弱	124	50.0	18.5	30.6	0.8
関節リウマチ	23	56.5	17.4	26.1	-
筋萎縮性側索硬化症	4	50.0	-	25.0	25.0
後縦靭帯骨化症	2	50.0	50.0	-	-
骨折を伴う骨粗鬆症	38	55.3	7.9	36.8	-
脊髄小脳変性症	1	100.0	-	-	-
脊柱管狭窄症	20	70.0	15.0	10.0	5.0
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	5	40.0	20.0	20.0	20.0
閉塞性動脈硬化症	10	50.0	20.0	30.0	-
慢性閉塞性肺疾患	11	81.8	-	18.2	-
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	24	50.0	16.7	29.2	4.2
その他	95	64.2	13.7	17.9	4.2

介護力の状況(問5-5-1)\*フォローアップの回数(問5-13-9-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	419	1.06	1.80	0.00	22.00
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	152	1.27	2.41	0.00	22.00
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	73	1.00	1.35	0.00	6.00
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	63	1.05	1.17	0.00	4.00
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	128	0.88	1.36	0.00	10.00
その他	3	0.33	0.47	0.00	1.00

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*フォローアップの回数(問5-13-9-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	617	0.99	1.58	0.00	22.00
自立度Ⅲ～M	144	1.16	1.73	0.00	15.00
自立度Ⅱ以下	419	0.99	1.59	0.00	22.00

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*フォローアップの回数(問5-13-9-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	617	0.99	1.58	0.00	22.00
認知症あり	233	1.17	2.06	0.00	22.00
認知症なし	369	0.89	1.19	0.00	10.00

人生の最終段階(終末期)にあるか(問5-9-1)\*フォローアップの回数(問5-13-9-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	617	0.99	1.58	0.00	22.00
はい	84	1.39	1.57	0.00	10.00
いいえ	533	0.93	1.57	0.00	22.00

利用者の疾患等(問5-12-1)\*フォローアップの回数(問5-13-9-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	617	0.99	1.58	0.00	22.00
脳血管疾患(脳卒中)	97	0.85	0.95	0.00	4.00
心疾患(心臓病)	176	0.94	1.52	0.00	15.00
悪性新生物(がん)	52	1.25	1.48	0.00	6.00
呼吸器疾患	64	1.11	1.65	0.00	10.00
関節疾患	65	1.03	1.26	0.00	6.00
認知症	233	1.17	2.06	0.00	22.00
パーキンソン病	37	1.24	1.71	0.00	10.00
糖尿病	113	1.26	2.39	0.00	22.00
視覚・聴覚障害	19	1.89	3.26	0.00	15.00
骨折・転倒	53	1.19	1.37	0.00	6.00
脊髄損傷	10	0.60	0.80	0.00	2.00
高齢による衰弱	123	1.17	1.33	0.00	10.00
関節リウマチ	21	0.52	0.66	0.00	2.00
筋萎縮性側索硬化症	4	1.25	1.30	0.00	3.00
後縦靭帯骨化症	2	2.00	0.00	2.00	2.00
骨折を伴う骨粗鬆症	37	0.78	0.78	0.00	2.00
脊髄小脳変性症	1	0.00	0.00	0.00	0.00
脊柱管狭窄症	21	1.19	1.01	0.00	3.00
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	4	1.50	0.50	1.00	2.00
閉塞性動脈硬化症	10	1.20	1.25	0.00	4.00
慢性閉塞性肺疾患	11	0.55	0.89	0.00	3.00
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	22	0.59	0.72	0.00	2.00
その他	93	1.05	1.79	0.00	15.00

介護力の状況(問5-5-1)\*情報提供の回数(全職種の数)(問5-17-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	398	2.65	2.26	0.00	16.00
独居であり近居の親類等にも介護者がいない	144	2.95	2.62	0.00	15.00
独居であるが近居の親類等に介護者がいる	70	2.37	1.85	0.00	12.00
同居しているが、同居・近居の親類等に介護力がある者がいない	61	2.72	1.99	0.00	10.00
同居していて、同居・近居の親類等に介護力がある者がいる	121	2.44	2.09	0.00	16.00
その他	2	1.00	0.00	1.00	1.00

問5-1-8をⅡ以下、Ⅲ～Mの2カテゴリ化したもの\*情報提供の回数(全職種の数)(問5-17-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	595	2.76	2.55	0.00	24.00
自立度Ⅲ～M	142	3.32	3.45	0.00	24.00
自立度Ⅱ以下	404	2.62	2.19	0.00	24.00

Q5-1-12 選択肢6の認知症に○が付いたか否か\*情報提供の回数(全職種の数)(問5-17-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	595	2.76	2.55	0.00	24.00
認知症あり	227	2.82	2.18	0.00	15.00
認知症なし	353	2.54	1.96	0.00	16.00

人生の最終段階(終末期)にあるか(問5-9-1)\*情報提供の回数(全職種の数)(問5-17-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	595	2.76	2.55	0.00	24.00
はい	79	4.03	4.78	0.00	24.00
いいえ	516	2.57	1.94	0.00	15.00

利用者の疾患等(問5-12-1)\*情報提供の回数(全職種の総数)(問5-17-2-1)

	全体	平均	標準偏差	最小値	最大値
全体	595	2.76	2.55	0.00	24.00
脳血管疾患(脳卒中)	99	2.65	1.57	0.00	10.00
心疾患(心臓病)	170	2.68	2.33	0.00	15.00
悪性新生物(がん)	50	2.82	2.04	0.00	14.00
呼吸器疾患	61	2.93	3.01	0.00	16.00
関節疾患	64	2.81	2.37	1.00	12.00
認知症	227	2.82	2.18	0.00	15.00
パーキンソン病	36	2.92	2.36	1.00	12.00
糖尿病	105	2.90	2.05	0.00	12.00
視覚・聴覚障害	19	3.84	4.15	1.00	15.00
骨折・転倒	51	3.51	2.97	0.00	12.00
脊髄損傷	10	3.20	3.09	1.00	12.00
高齢による衰弱	118	2.82	2.15	0.00	12.00
関節リウマチ	20	3.00	2.37	1.00	12.00
筋萎縮性側索硬化症	4	2.25	0.43	2.00	3.00
後縦靭帯骨化症	2	3.50	2.50	1.00	6.00
骨折を伴う骨粗鬆症	36	2.61	1.74	1.00	9.00
脊髄小脳変性症	1	2.00	0.00	2.00	2.00
脊柱管狭窄症	20	2.80	2.29	1.00	12.00
早老症	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	4	5.25	4.26	1.00	10.00
閉塞性動脈硬化症	10	3.30	2.45	1.00	9.00
慢性閉塞性肺疾患	10	1.80	1.66	1.00	6.00
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症	22	3.23	3.27	1.00	12.00
その他	93	3.10	2.55	1.00	15.00